심근경색 후 발생한 후방부 심실중격파열증 교정 후 재발된 심실중격파열에 의한 승모판막 폐쇄부전증

- 증례 보고 -

가톨릭대학교 의과대학 *성바오로병원 흉부외과학교실, †강남성모병원 흉부외과학교실

박 찬 범* · 진 웅†

Mitral Regurgitation due to Recurrent Septal Rupture after Repair of a Postinfarction Posterior Ventricular Septal Defect

- A Case Report -

Chan Beom Park, M.D.* and Ung Jin, M.D.†

Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, *St. Paul's Hospital,

†Kangnam St. Mary's Hospital, The Catholic University of Korea College of Medicine, Seoul, Korea

Postinfarction ventricular septal rupture (VSR) is a serious complication following an acute myocardial infarction. We performed repair of a postinfarction posterior VSR; however, the patient developed mitral regurgitation (MR) 2 months later. Geometrical changes caused by ventricular remodeling and recurrent shunt are thought to be the cause of delayed MR.

Key Words: mitral regurgitation, shunt, ventricular septal rupture.

심근경색 후 심실중격파열은 심근경색 1-7일 후에 발생하는 매우 심각한 합병증으로 과거에는 괴사된 심근이 섬유성 반흔조직으로 바뀔 때까지 약 6주간 수술을 연기하는 것이 권장되었으나, 이러한 연장이 부정맥, 다발성 장기부전의 위험성을 증가시키고, 대부분의 환자는 수술전에 심부전이나 심인성 속으로 사망하게 되어 최근에는 진단후 24시간 이내에 응급수술이 권장된다. 수술 후 생존한 환자의 10-25%에서 잔존 또는 재발성 중격결손파열이 발생하며 높은 사망률과 연관이 있는 것으로 알려져 있다. 심근경색 후 중격결손파열의 수술시에 승모판막 폐쇄부전이 동반된 경우나, 수술 직후 발생하는 경우는 드물게 보고되어 있으나 본 증례와 같이 2개월간의 시간이 경과한 후에 발생하는 승모판막 폐쇄부전은 거의 보고되어 있지 않다.

증례

평소 건강하게 지냈던 59세 남자 환자가 호흡곤란을 주소로 타병원에서 급성심근경색 및 심실중격파열을 진단받고 수술을 위해 전원되었다. 내원시 혈압은 70/50 mm/Hg, 맥박은 분당 92회로 심인성 속 상태였다. 심전도상에서는 Lead II, III, aVF에서 Q wave와 ST 분절의 상승소견을 보이고 있었으며, 흉부 방사선 촬영에서는 폐부종과 양측의 늑막삼출액 소견을 보이고 있었다. 심초음파 검사상 좌심실구혈율(ejection fraction)은 60% 이상이었으나, 하부중격 무운동(inferoseptal akinesia)과, 중부의 중격에 2.6 cm 크기의 근육성 결손이 관찰되었으며, 경도에서 중등도의 삼첨판막 폐쇄부전증과 심한 폐동맥 고혈압(수축기 폐동맥 혈압 = 80 - 85 mmHg)으로 우심실부전소견을 보였다. 관상동맥조영술상 좌전하행지 중간부위에 40%의 협착이 관찰되었으며, 좌회전분지는 발달이 덜 되어있었으며, 원위부에서는 완전 폐쇄소견을 보이고 있었고, 후하행지(posterior descending artery)에서도 완전협착소견을 보이고 있었다. 좌심실조영술상에서는 승모판막폐쇄부전은 관찰되지 않았으나,첨부에서

논문접수일 : 2008년 11월 3일, 승인일 : 2009년 4월 6일
책임저자 : 진 웅, 서울시 서초구 반포동 505번지
강남성모병원 흉부외과
우편번호 : 137-701
Tel: 02-590-1442, Fax: 02-594-8644
E-mail: ungjin@catholic.ac.kr

Fig. 1. Echocardiography showed the recurrent shunt. LV: left ventricle; RV: right ventricle; LA: left atrium; VSR: ventricular septal rupture.

근육성 심실중격결손을 보이고 있었고, 좌심실구혈율은 69%였다.

수술실 소견상 심실중격파열은 후방부 심실중격의 중간 부위와 우심실벽에 인접하여 위치하고 있었다. 결손부위의 가장자리는 매우 불규칙하였고, 크기는 약 0.5×2.0 cm이었다. 후중유두근(posteromedial papillary muscle)의 기저부까지 심근경색이 진행된 소견을 보였으나, 유두근은 손상되지 않았다. 수술은 후하행지에서 약 0.5 cm 떨어진 부위에 좌심실절개를 시행하였으며, 2개의 우심낭을 이용하여 연속봉합으로 경색부위 배제술식(infarct exclusion)을 시행하였고, 좌심실절개 부위는 teflon patch를 이용하여 봉합하였다. 후하행지는 심실봉합시 회생되었으며, 좌회선분지는 발육이 저하되어 있었고 직경이 작아 관상동맥우회로술을 시행하지 않았다.

술 후 5병일 및 11병일째 시행한 심초음파검사상에서 잔존 단락이나 승모판막 폐쇄부전은 관찰되지 않았으며, 좌심실구혈율은 36%였다. 우심실의 확장은 더 이상 관찰되지 않았고, 삼첨판막 폐쇄부전도 소량으로 감소되었고, 폐동맥 고혈압도 보이지 않았다.

이후 타병원에서 외래추적 관찰중 수술 2개월째 다시 호흡곤란이 발생되었으며, 심초음파 검사에서 좌심실 기능은 보전되어 있었으나, 좌우 단락(Fig. 1)과 중등도 이상의 승모판막 폐쇄부전이 새롭게 발견되었다(Fig. 2). 척삭(chordae)이나첨판(leaflet)의 이상소견이 관찰되지 않는 것으로 보아 승모판막 폐쇄부전의 원인은 허혈성으로 생각되었다. 삼첨판막 폐쇄부전은 경도에서 중등도로 악화되었고, 수축기 폐동맥 고혈압도 62 mmHg로 증가되어 있었다. 관상동맥조영술에서는 이전과 별다른 차이가 없었으며, Qp/Qs (폐순환/전신순환)는 2.2였다.

심근경색 후 심실중격파열의 재발과 승모판막 폐쇄부전의 진단하에 재수술을 시행하였다. 재수술 소견상 연속봉합

Fig. 2. Severe mitral regurgitation was revealed by 4-chamber view.

하였던 우심낭 패취가 헐거워져 있어, 비연속성 봉합을 시행하여 다시 심실중격파열의 배제술식을 시행하였으며, 승모판막의 모양은 비교적 정상이었으나, 식염수검사상 소량의 폐쇄부전이 관찰되어 25 mm Saint Jude tailor ring (St Jude Medical, Inc, St Paul, Minn., USA)을 이용한 축소성 완전고리성형술(Reduction complete ring annuloplasty)을 시행하였으며, 체외순환시간은 272분이었고 대동맥차단시간은 212분이었다. 수술 후 상당량의 출혈이 있었으며, 2병일째에는 범발성 응고장애증후군 소견을 보이며, 급성 신부전소견을 보여 복막투석을 시행하였으나, 환자는 수술후 5병일째 다발성 장기부전으로 사망하였다.

고 찰

심근경색 후 심실중격파열은 전층의 경색 1-7일 후에 발생하는 매우 심각한 합병증으로 수술적 치료를 시행하지 않으면 사망률이 1주일째에는 50%, 6주후에는 87%에 이르는 매우 치명적인 질환이다.¹⁾

전방부 심실중격파열은 대개 근위부 좌전하행지의 협착과 연관이 있으며, 심실중격 전방의 원위부에서 주로 발생하는 반면, 후방부 심실중격파열은 우성의(Dominant) 우관상동맥이나 좌회선분지의 협착에 의해 발생되며, 심실의 유리벽(Free wall) 경색과 연관이 있고, 위치는 대개 승모판막 고리와 인접한 기저부의 근위부 중격에서 주로 발생한다.

심인성 쇼크는 심근경색후 심실중격파열 환자에서 매우 중요한 수술사망의 결정인자로서, 다양한 인자들에 의해 초래되지만, 특히 광범위한 우심실경색을 가진 후부 심실중격파열 환자에서는 우심실기능부전이 수술후 경과의 가장 중요한 결정인자이다. 그러나 이러한 우심실기능부전은 수술 후 점차적으로 호전되기 때문에 만기생존에는 별다른 영향을 미치지 않으며,²⁾ 본 증례에서도 첫번째 수술 후 우심실기능은 점차 호전되었으나, 재발시에는 처음과 같이 다시

우심실 기능이 악화되는 소견을 보였다.

전방부 중격파열에서의 좌전하행지나 후방부 중격파열에서 후하행지는 급성으로 경색된 심근에 혈액을 공급하고 있기 때문에 대개 우회로술을 시행할 필요는 없으며, 특히 후부중격파열에서는 심실의 절개를 전부중격파열에서의 절개와 달리 후하행지에서 1-2 mm 측면으로 중격에 가깝게 시행해야 후유두근의 손상을 피할 수 있어,³⁾ 후하행지에 근접한 절개는 필연적으로 후하행지를 희생시키게 된다. 본 증례의 경우에서도 후하행지는 절개불합시 희생되어 우회로술을 시행하지 않고 중격파열의 교정만 시행하였으나, 우회로술을 시행하지 못할 경우 경색 근육 부위의 확장(Infarct extension)에 의한 좌심실의 개조가 진행될 수 있고,⁴⁾ 이에 의한 좌심실 구조의 변화는 본 증례의 경우에서처럼 승모판막 폐쇄부전을 초래할 수 있을 것으로 생각된다.

잔존 또는 재발성 중격결손파열은 생존한 환자의 10-25%에서 발생하며 높은 사망율과 연관이 있는 것으로 알려져 있으며,⁵⁾ 적은 잔존 단락을 가진 무증상의 환자에서는 보존적 요법이 시도될 수도 있으나, 본 증례에서처럼 QP/QS가 2.0 이상인 경우에는 수술적 치료가 반드시 고려되어야 한다.

심근경색후 중격결손파열의 수술시에 승모판막 폐쇄부전이 동반된 경우나, 수술후 발생하는 경우는 드물게 보고되어 있으나³⁾ 본 증례와 같이 2개월간의 시간이 경과한 후에 발생하는 승모판막 폐쇄부전은 거의 보고되어 있지 않다.

심근경색후 중격결손파열의 수술후에는 경색의 확장⁴⁾ 비수축성 지역의 연장을 일으키게 되고, 이는 2차적으로 점차적인 용적 과부하 비대(Volume-overload hypertrophy)를 일으키게 되며, 감소된 심실구혈율을 보상하여 심박출량을 유지하기 위하여 좌심실의 크기는 더욱 커지게 되며, 좌심실은 개조 과정을 진행하게 되고, 특히 후방 심실중격파열에서 희생된 후하행지와 경색된 하부 좌심실의 개조과정에 의한 형태의 변화가⁶⁾ 본 증례에서처럼 지연성으로 승모판

막 폐쇄부전증을 일으킬 수 있을 것으로 생각된다. 또한 본 증례에서는 수술 직후에는 관찰되지 않았으나 재발된 단락이 지속적으로 좌심실의 용적 과부하를 초래하였으며, 이것이 좌심실의 확장을 가속시켜 승모판막 폐쇄부전을 악화시켰을 것으로 추측된다.

따라서, 심근경색후 후방부 중격결손파열의 수술후에는 추적관찰시 승모판막 폐쇄부전이 발생할 수 있어, 단락 재발의 발생유무와 함께 주의깊은 추적관찰과 적극적인 치료가 필요하다고 생각된다.

참 고 문 헌

- 1) Sanders RJ, Kern WH, Blount SG Jr: Perforation of the inter-ventricular septum complicating myocardial infarction. *Am Heart J* 1956; 51: 736-48.
- 2) Skillington P, David TE: Post-infarction ventricular septal rupture. In: Buxton B, Frazier OH, Westaby S, eds. *Ischemic heart disease. Surgical management*. 1st ed. London, Mosby. 1999, pp 293-301.
- 3) David TE, Dale L, Sun Z: Postinfarction ventricular septal rupture: repair by endocardial patch with infarct exclusioin. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1995; 110: 1315-22.
- 4) Pfeffer MA, Braunwald E: Ventricular remodeling after myocardial infarction. Experimental observations and clinical implications. *Circulation* 1990; 81: 1161-72.
- 5) Birnbaum Y, Fishbein MC, Blanche C, Siegel RJ: Ventricular septal rupture after acute myocardial infarction. *N Engl J Med* 2002; 347: 1426-32.
- 6) Kumanohoso T, Otsuji Y, Yoshifuku S, Matsukida K, Koriyama C, Kisanuki A, et al: Mechanism of higher incidence of ischemic mitral regurgitation in patients with inferior myocardial infarction: quantatative analysis of left ventricular and mitral valve geometry in 103 patients with prior myocardial infarction. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2003; 125: 135-43.