유산산증 없이 메포르민으로 유발된 급성 신손상 1예

- 증례 보고 -

한양대학교 의과대학 내과학교실, 한양대학교 의과대학 구리병원 내과학교실*

정해룡 · 최정임 · 박정환 · 홍상모* · 박준성 · 이창범* · 박용수* · 김동선 · 최웅환 · 안유현

A Case of Metformin-Induced Acute Kidney Injury without Lactic Acidosis

- A Case Report -

Hae Ryong Jeong, M.D., Jeong Im Choi, M.D., Jung Hwan Park, M.D., Sang Mo Hong, M.D.*, Joon Sung Park, M.D., Chang Beom Lee, M.D.*, Yong Soo Park, M.D.*, Dong Sun Kim, M.D., Woong Hwan Choi, M.D. and You Hern Ahn, M.D.

Department of Internal Medicine, Hanyang University College of Medicine, Seoul, Korea,

*Department of Internal Medicine, Hanyang University College of Medicine, Guri, Korea

Metformin is an oral antidiabetic drug in the biguanide class, which is used for type 2 diabetes. The side effects of metformin are mostly limited to digestive tract symptoms, such as diarrhea, flatulence and abdominal discomfort. The most serious potential adverse effect of metformin is lactic acidosis. A 51-year-old man was admitted due to hypoglycemia as a result of an overdose of antidiabetic drugs. He took massive dose of metformin. Conservative treatment failed for metabolic acidosis without lactic acidosis accompanied by acute kidney injury. Hemodialysis was executed to correct the high anion gap metabolic acidosis and acute kidney injury, and the patient recovered fully from metabolic acidosis. This case illustrates that the presence of clinical conditions, such as metformin-induced acute kidney injury and metabolic acidosis, can be developed without lactic acidosis. Prompt recognition of metabolic acidosis and early intervention with hemodialysis can result in a successful clinical outcome.

Key Words: hemodialysis, lactic acidosis, metabolic acidosis, metformin.

메포르민은 저혈당, 체중 증가 또는 고인슐린혈증을 유발하지 않는 장점이 있는 인슐린 민감제(insulin sensitizer)로 제2형 당뇨병에서 특별한 금기사항이 없다면 일차치료제로 널리 사용되고 있다.[1] 메포르민의 경구투여 시에 발생할 수 있는 흔한 부작용은 설사, 복부 불편감, 식욕 저하, 오심 등의 위장관계 부작용이 있고 약물 투여 용량과 상관성이 있으며, 내성이 생길 수 있다.[2] 심각한 부작용 중 하나인 유산산증은 주로 신기능 저하, 간 기능 부전 및 조직 저산소증을 유발하는 심부전 및 패혈증 등이 동반된 환자에서 발생하는 것으로 알려져 있다.[3] 하지만 메포르민으로 인한

부작용 중 급성 신손상에 대해서는 명시되어 있지 않다.

저자들은 2형 당뇨병으로 진단받고 메포르민과 설폰아마이드제를 복용하는 환자에서 자살목적으로 약제 과다복용 후 발생한 저혈당과 의식 혼미를 주소로 내원하여 검사결과 유산산증 없이 발생한 급성 신손상 및 이로 인한 대사성 산증으로 보존적 치료로는 악화되어 혈액투석으로 호전되었던 경험을 하였기에 보고하는 바이다.

증례

내원 3년 전 본원에서 고혈압과 제2형 당뇨병을 진단받고 연고지 의원에서 경구혈당강하제를 복용하던 51세 남자환자로 내원 수일 전부터 심리적인 스트레스로 식사를 잘 하지 못하고 지내다가 내원 당일 자살 목적으로 술과 함께 경구당뇨병약제 20여알을 복용 후 응급실로 내원하였다. 내원 당일 정오에 약제를 과다복용 하였고 발견 당시 구급대

논문접수일 : 2012년 9월 12일, 수정일 : 2012년 10월 23일(1차), 2012년 11월 5일(2차), 승인일 : 2012년 11월 5일
책임저자 : 안유현, 서울시 성동구 왕십리로 222
한양대학교병원 내분비내과
우편번호: 133-792
Tel: 02-2290-9556, Fax: 02-2298-9183
E-mail: ahnyh@hanyang.ac.kr

원이 측정된 말초혈액 혈당검사에서 혈당수치가 측정되지 않았다. 그 원인은 설펜아미이드제의 과량 복용과 알코올 섭취 때문으로 추정되었다. 환자가 복용한 약은 글루리아드정®으로 메포르민과 글리벤클라미드 복합제이다.

최근 매일 소주 2병 이상을 마셔온 음주력 및 20갑년의 흡연력이 있었다. 내원 3년전 본원에서 검사한 혈액검사에서 혈액요소질소(blood urea nitrogen, BUN) 11 mg/dl, 크레아티닌(Creatinine) 0.8 mg/dl이고 계산되어 나온 사구체여과율(eGFR)은 110 ml/min/1.73 m²으로 정상이었다. 생화학검사에서 나트륨 136 mM/L, 칼륨 4.0 mM/L, 염화물 98 mM/L, 중탄산염 32.9 mM/L이었다.

환자는 신장 165 cm 체중 74 kg이었고, 내원 당시 체온 36°C, 맥박 수 94 beats/min, 호흡 수 18 breaths/min, 혈압 186/83 mmHg이었으며, 구급대원에게 발견 당시의 의식은 혼미하였으나 포도당 수액 투여를 시행하면서 이동하여 응급실 도착 당시 의식은 비교적 명료하였다. 신체 검진에서 이상 소견은 없었으며, 말초혈액검사에서는 백혈구 18,400/ μ l, 혈색소 16.8 g/dl, 혈소판 198,000/ μ l이었다. 혈청 생화학검사에서 포도당은 170 mg/dl로 포도당 수액이 투여되는 상태에서 검사되었기 때문에 낮게 측정되지 않았다. 알부민 4.1 g/dl, AST 39 U/L, ALT 29 U/L, 유산탈수소효소 214 U/L, 크레아티닌산화효소 185 U/L, 총 빌리루빈 0.6 mg/dl였다. 혈액요소질소 25 mg/dl, 크레아티닌 2.1 mg/dl로 상승 소견을 보였고 나트륨 140 mM/L, 칼륨 4.7 mM/L, 염화물 92 mM/L로 측정되었으며 중탄산염은 14.7 mM/L로 감소되어 있었고 C-반응단백질(C-reactive protein, CRP) 0.3 mg/dl 미만으로 정상이었다. 나트륨 분획배설률은 5.5%로 계산되었다. 혈중 케톤은 검출되지 않았다. 동맥혈가스검사는 pH 7.340, pCO₂ 32.9 mmHg, pO₂ 91.2 mmHg, HCO₃⁻ 18.6 mM/L로 호흡으로 보상된 대사성 산증 소견을 보였다. 음이온차는 33.3 mM/L로 상승되어 있었고 혈중 유산수치는 1.69 mM/L로 정상이었다. 소변검사에서 알부민 2+, 포도당 trace, 케톤 음성이었고, 혈청 삼투압은 288 mOsm/kg이었다. 당화혈색소 5.9%, C-펩타이드 5.64 ng/ml였으며, 인슐린 항체는 4.6%로 음성이었다. 복부초음파에서 양측 신장의 크기는 작아져 있지 않았으며 신장 실질내의 영상소견도 특이 소견이 없었다. 머리 CT에서 급성 출혈을 시사할 만한 소견은 관찰되지 않았다.

3년 전 검사와 비교하였을 때 크레아티닌 수치가 0.8 mg/dl에서 응급실 내원하였을 때 2.1 mg/dl로 상승되었고 나트륨 분획배설률도 상승되어 있었으며 유산산증이 없는 고음이온차 대사성 산증 소견을 보였다. 입원하여 2일간 중탄산염 및 이뇨제 투여 등의 보존적 치료를 시행하였으나 혈청 크레아티닌이 4.6 mg/dl로 지속적으로 상승하면서 소변이 나오지 않았고 흉부 방사선 검사에서 양측 폐부종 소견을 보이는 신부전 악화로 지속적 신대체요법을 시작하였다. 지속적 신대체요법을 시작하고 2일째 3,460 ml의 소변이 나

오기 시작하였고, 다음날은 6,690 ml의 소변이 배출되었다. 이후 혈액투석을 중단하고 매일 7,326 ml, 9,736 ml, 11,900 ml, 4,700 ml의 소변이 나오고 크레아티닌은 2.2 mg/dl, 1.9 mg/dl, 1.5 mg/dl로 점차 호전되어 투석을 하지 않고 경과관찰하였다. 환자는 저혈당과 급성 신부전을 동반한 대사성 산증에서 회복하였고 혈당 조절을 위해 설펜아미이드 계열의 약제와 보글리보스 계열의 약제를 투여 후 저혈당이 없는 것을 확인하고 퇴원하였다.

고 찰

메포르민은 165 kDa으로 경구 복용 시 소장에서 50-60%가 흡수되어 1-2시간 내에 최고혈장농도에 도달하며 혈장반감기는 1.5-4.9시간이다. 대부분이 신장을 통해 배설되므로 혈장 메포르민의 농도는 혈청 크레아티닌과 상관관계가 있다.[4] 최근 메포르민 사용이 늘면서 이와 관련된 부작용 발생 또한 증가하고 있다. 메포르민의 부작용으로는 위장관계 증상(구역, 구토, 설사, 복통)이 흔하고 드물게는 비타민 B12와 엽산의 흡수 장애, 용혈성 빈혈, 급성 간염과 유산산증이 발생할 수 있다.[5] 유산산증은 메포르민에 의한 대사성 합병증으로는 드물지만 심각한 부작용을 초래할 수 있고 사망률이 30-50%로 매우 높게 보고되고 있다.[6] 하지만 정상 신기능을 가진 환자에서 메포르민에 의한 유산산증의 위험성은 낮기 때문에 많이 사용되고 있는 약제이다. 다만 사구체여과율(eGFR) 60 ml/min/1.73 m² 이하의 당뇨병성 신증이 있거나 80세 이상의 고령에서 부작용의 가능성이 크기 때문에 신기능의 평가가 정기적으로 이루어져야 한다.[6,7] 메포르민으로 인한 부작용 중 급성 신손상에 대해서는 명시되어 있지 않으며 유산산증 없이 대사성 산증을 동반한 급성 신손상은 국내에서 보고된 바가 없다.

본 증례의 환자는 메포르민과 글리벤클라미드 복합제 이외의 다른 약제 복용력은 없었다. 글리벤클라미드의 경우 설펜아미이드제로 약제의 부작용으로 급성 신손상에 대해서는 메포르민과 마찬가지로 명시된 바가 없다. 하지만 실험적으로 쥐의 신장 허혈 및 재관류 손상에 대해 글리벤클라미드가 예방 효과가 있는 것으로 보고가 되어 있다.[8] 따라서 글리벤클라미드보다는 메포르민으로 인한 급성 신손상 발생 가능성이 더 높을 것으로 판단된다.

일반적인 고음이온차 대사성 산증의 흔한 원인으로는 유산산증, 케톤산증, 신부전, 대량의 황문근용해증 및 약물이나 독성 물질 섭취가 있다. 알코올의 경우 케톤산증 및 경도의 유산산증을 유발할 수 있으나 유산 수치 정상 및 케톤 검사 결과는 음성이었다. 대량의 황문근용해증 소견은 보이지 않았으며 메포르민과 글리벤클라미드 이외에 다른 약제나 독성 물질 복용력은 없었다. 또한 음이온차 증가량/혈중 중탄산 농도 증가량(delta anion gap/delta HCO₃⁻) 비율을 보았

을 때 일반적으로 유산산증에서는 대략 1.6 : 1 정도, 케톤 산증에서는 1 : 1에 근접하는 수치를 보이며 대사성 알칼리증과 동반된 대사성 산증의 경우에 2 : 1 이상의 비율을 보일 수 있는데, 본 증례에서의 비율은 2.3 : 1로 혈중 유산 수치 정상 및 케톤 음성 소견을 고려하면 체액량 감소를 통한 부수적인 대사성 알칼리증이 동반된 상태로 메포르민 과다복용으로 인한 급성 신손상 및 대사성 산증이 복합적으로 작용하여 높은 음이온차 증가량/혈중 중탄산 농도 증가량(Δ anion gap/ Δ HCO₃⁻) 비율을 보이는 고음이온차 대사성 산증이 발생한 것으로 추정한다.[9] 또한, 메포르민을 과다 복용하였지만 유산 수치가 높지 않았던 이유는 식사를 거의 하지 않은 상태에서 글리코겐분해를 통해 글리코겐이 소모되어 고갈된 상태로 설펜아미드제의 과량 복용으로 심한 저혈당이 발생하였고 알코올 과다복용으로 인한 체내 당신생 과정의 억제 및 글리코겐분해의 억제가 발생하면서[10] 유산이 생성되려면 필요한 포도당 같은 기질의 공급이 이루어지지 않아서 발생하였을 것으로 추정한다.

급성 신손상 및 대사성 산증의 초기 치료는 근원적인 원인 교정에 초점이 맞추어져야 하며 수액 및 전해질 불균형 교정이 이루어져야 한다.[11,12] 보존적 치료에 반응하지 않는 심각한 급성 신손상에서 급성 혈액투석의 일반적 적응증은 용적 과부하, 고칼륨혈증, 대사성 산증, 심한 요독증으로 인한 증상 및 징후 발생이다. 지난 40년 동안 간헐적 혈액투석은 심각한 급성 신손상의 표준 신대체요법이었다. 최근에는 지속적요법이 대두되고 있는데, 장점으로는 수액 및 대사적 조절을 더욱 정밀하게 할 수 있고 혈액동학적 불안정성을 줄이면서 유해한 사이토카인(cytokine) 제거 가능성을 향상시킨다.[12] 대사성 산증은 혈중 유산 농도의 증가 없이도 사망률 증가와 연관이 있으며 환자 치료 결과의 믿을만한 예측 인자이다.[13] 메포르민에 의한 대사성 산증의 경우 일반적인 대사성 산증의 치료에서와 같이 정맥 내 중탄산염의 투여만으로는 충분히 산 염기 대사를 교정할 수 없으므로 메포르민으로 인한 대사성 산증의 진단이 확실하면 즉시 혈액투석을 시행하는 것이 예후를 개선하는데 도움이 된다.[4] 과거에는 이노제 사용, 수액공급과 중탄산염 투여에 의한 대사성 산증의 교정이 시도되었으나, 급성 신부전을 해결하지 못하고 환자의 상태를 악화시킨 것으로 밝혀져 더 이상 시행되지 않는다.[14] 메포르민에 의해 발생한 대사성 산증을 교정하기 위해 정맥내로의 중탄산염 투여는 충분히 산 염기 대사를 교정할 수 없다. 이러한 이론적 배경은 산화헤모글로빈 해리 곡선(oxyhemoglobin dissociation curve)의 좌측 이동, 나트륨 과부하, 반동성 대사성 알칼리증, 혈청 칼륨 및 칼슘장애와 반사적 혈관확장이 일어나기 때문이다.[15] 본 증례에서는 유산산증이 동반되지 않았기 때문에 초기에 급성 신손상과 고음이온차 대사성 산증을 교정하기 위해서 일반적인 치료로써 중탄산염의 투여 및 보존적 치

료를 시행하였으나 급성 신손상과 대사성 산증이 호전되지 않고 오히려 악화되어 혈액투석을 시행하였다. 따라서 유산산증이 없더라도 다른 원인이 없이 메포르민과 관련된 급성 신손상을 동반한 고음이온차 대사성 산증의 경우에는 진단 즉시 빠른 혈액 투석의 시행에 대해 고려해야 한다.

결론적으로 메포르민 과다복용으로 유산산증 없이 대사성 산증을 동반한 급성 신손상을 보고한 예는 국내에서 보고된 바가 없어 문헌 고찰과 함께 보고하는 바이다.

참 고 문 헌

- 1) Choi HS, Jung KH, Shim JJ, Chae MJ, Lee SH, Lee TW, et al: A case of metformin-associated lactic acidosis. *Korean J Nephrol* 2004; 23 :143-6.
- 2) Bailey CJ, Turner RC: Metformin. *N Engl J Med* 1996; 334: 574-9.
- 3) Kang BS, Kim HW, Kim MH, Park JW, Bae KS, Park HC, et al: A case of severe lactic acidosis induced by metformin overdose. *Korean J Med*. 2008; 75: 894-7.
- 4) Kang BI, Kim SJ, Kim JH, Gil HW, Yang JO, Lee EY, et al: Two cases of metformin-induced lactic acidosis successfully treated by hemodialysis. *Korean J Med* 2011; 80: 473-6.
- 5) Alivanis P, Giannikouris I, Paliouras C, Arvanitis A, Volanaki M, Zervos A: Metformin-associated lactic acidosis treated with continuous renal replacement therapy. *Clin Ther* 2006; 28: 396-400.
- 6) Kirpichnikov D, McFarlane SI, Sowers JR: Metformin: an update. *Ann Intern Med* 2002; 137: 25-33.
- 7) Shaw JS, Wilmot RL, Kilpatrick ES: Establishing pragmatic estimated GFR thresholds to guide metformin prescribing. *Diabet Med* 2007; 24: 1160-3.
- 8) Pompermayer K, Souza DG, Lara GG, Silveira KD, Cassali GD, Andrade AA, et al: The ATP-sensitive potassium channel blocker glibenclamide prevents renal ischemia/reperfusion injury in rats. *Kidney Int* 2005; 67: 1785-96.
- 9) Burton David Rose: *Clinical Physiology of Acid-Base and Electrolyte Disorders*. 3rd ed. International edition, McGraw-Hill. 1989, pp 506-12.
- 10) Jang JE, Koh EH: The impacts of alcohol consumption on glucose metabolism. *J Korean Diabetes* 2012; 13: 81-4.
- 11) Morris CG, Low J: Metabolic acidosis in the critically ill: part 2. Causes and treatment. *Anaesthesia* 2008; 63: 396-411.
- 12) Thadhani R, Pascual M, Bonventre JV: Acute renal failure. *N Engl J Med* 1996; 334: 1448-60.
- 13) Lee KM: Influence of blood glucose level on acid-base balance. *Korean J Crit Care Med* 2009; 24: 17-21.
- 14) Bong JD, Kwak SH, Boo KB, Sim DS, Lee TW: Outcome of Early Diagnosis and Hemodialysis in Acute Renal Failure due to Metformin-associated Lactic Acidosis in Elderly Type 2 Diabetes Mellitus Patient. *J Korean Geriatr Soc* 2004; 8: 115-8.
- 15) Heaney D, Majid A, Junor B: Bicarbonate haemodialysis as a treatment of metformin overdose. *Nephrol Dial Transplant* 1997; 12: 1046-7.